



**W związku z wykryciem w Niemczech pierwszego przypadku pryszczycy, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Toruniu przygotował informację z zaleceniami dla lokalnych gospodarstw i hodowli. Choroba nie jest groźna dla ludzi.**

Pierwszy od 37 lata przypadek pryszczycy wykryto u wołów domowych utrzymywanych w gospodarstwie na terenie Niemiec, zlokalizowanym w odległości około 70 kilometrów od granicy z Polską. Pryszczycza (Foot and mouth disease - FMD) jest zakaźną i zaraźliwą chorobą wirusową zwierząt parzystokopytnych domowych oraz dzikich. Na zakażenie najbardziej wrażliwie jest bydło, następnie świnie, owoce i kozy. Chorobę wywołuje wirus z rodzaju Aphthovirus należący do rodziny Picornaviridae. Kraj, w którym wystąpi FMD, narażony jest na bardzo duże straty ekonomiczne w przemyśle mięsnym oraz hodowli, a także obowiązkową likwidację stad, w których stwierdzono zakażenie. **Choroba nie jest groźna dla ludzi.**

**Drogi zakażenia:**

Zakażone zwierzęta wydalają wirus z wydychanym powietrzem, wydzielinami oraz wydaliniami. Największa koncentracja wirusa znajduje się w płynie surowiczym i

nabłonku pojawiających się pęcherzy. Zwierzęta mogą być nosicielami wirusa nawet do kilku lat.

### **Źródła zakażenia:**

- zakażone zwierzęta;
- ślina, mleko, kał, pasza, woda, żłoby, podłogi, pastwiska, skóra wełna;
- mięso i jego przetwory nie poddane odpowiedniej obróbce,
- nasienie i zarodki;
- wektory mechaniczne: środki transportu, narzędzia i sprzęt używany przy pracy ze zwierzętami wrażliwymi, ręce, odzież i obuwie obsługi, gryzonie, ptaki;
- odpadki kuchenne.

### **Ochrona zwierząt przed chorobą**

W celu ochrony stada przed wniknięciem wirusa pryszczycy należy pamiętać, żeby zwierzęta wprowadzane do stad pochodziły z wiadomego źródła i były oznakowane, a jeżeli pochodzą z innego kraju – zaopatrzone w świadectwo zdrowia potwierdzające ich pochodzenie i status zdrowotny.

Należy bezwzględnie przestrzegać zasad bioasekuracji. W gospodarstwie utrzymującym bydło, trzodę chlewną, owoce i kozy powinny znajdować się przede wszystkim:

- maty dezynfekcyjne w ilości zapewniającej zabezpieczenie wejść i wjazdów do gospodarstwa,
- środki dezynfekcyjne w ilości niezbędnej do przeprowadzenia doraźnej dezynfekcji,
- wydzielone miejsce do składowania środków dezynfekcyjnych przed dostępem osób niepowołanych,
- odzież i obuwie przeznaczone tylko do użycia w gospodarstwie,
- budynki, w których utrzymywane są zwierzęta, powinny być utrzymane w czystości i zabezpieczone przed dostępem innych zwierząt niż utrzymywane w gospodarstwie.

Obraz [annigje](#) z [Pixabay](#)

- [Powrót](#)
- [Udostępnij na: X](#)
- [Udostępnij na: FB](#)
- [Drukuj](#)
- [PDF](#)